


Ceratitis cosyra (Walker)



1



Lobe postpronotal avec point noir autour de la soie


Point noir autour de la soie préscutellaire

Marge apicale du scutellum avec trois macules noires séparées


2

Bande jaune-noire sur la marge antérieure de l'aile

Bande jaune-noire sur le centre de l'aile



3



Abdomen jaune avec bandes transversales gris argenté

Anglais: Mango fruit fly, marula fruit fly. Mouche des fruits de taille moyenne (longueur 3.4-5.4 mm). Polyphage, principale espèce de *Ceratitis* ravageuse des mangues. Largement répandue dans toute l'Afrique subsaharienne. Les deux sexes peuvent être attirés par des produits à base d'appâts protéiques. Les mâles peuvent être piégés au terpinyl acetate et l'Enriched Ginger Oil (EGO) lure.

Informations supplémentaires: <http://projects.bebif.be/fruitfly/taxoninfo.html?id=26> Restriction: ces fiches signalétiques se limitent aux caractères observés chez les principales espèces nuisibles mais ne tiennent pas compte des similitudes/différences entre TOUTES les espèces de mouches des fruits présentes en Afrique occidentale. Copyright: texte & images G. Goergen, IITA. Remerciements: M. De Meyer, MRAC est remercié pour son appui à la conceptualisation des fiches signalétiques.