




Dacus bivittatus (Bigot)



①



Petites marques semi-circulaires antérieures à la suture transversale

Stries jaunes médianes et latérales présentes

Bande costale complète et étendue, s'élargissant à son extrémité



②

③ *



Anatergite et

katatergite tous deux jaunes

Anglais: Pumpkin fly, greater pumpkin fly. Mouche des fruits de moyenne taille (longueur 6.4-8.5 mm). L'un des principaux ravageurs des cucurbitacées sauvages et cultivées. Se développe parfois aussi sur les Solanaceae cultivées. Largement répandue en Afrique subsaharienne. Les deux sexes peuvent être attirés par des produits à base d'appâts protéiques. Les mâles peuvent être piégés au cue lure.

Informations supplémentaires: <http://projects.bebif.be/fruitfly/taxoninfo.html?id=211> Restriction: ces fiches signalétiques se limitent aux caractères observés chez les principales espèces nuisibles mais ne tiennent pas compte des similitudes/différences entre TOUTES les espèces de mouches des fruits présentes en Afrique occidentale. Copyright: texte G. Goergen, IITA; images G. Goergen, IITA & *NHM, London. Remerciements: M. De Meyer, MRAC est remercié pour son appui à la conceptualisation des fiches signalétiques.