






# *Dacus ciliatus* Loew



Scutum essentiellement rouge-brun sans aucune strie jaune

Tache à l'extrémité de l'aile petite

Bande costale complète et étroite



Anatergite marron (principale différence avec *Dacus frontalis*)

Katatergite jaune

Anglais: Ethiopian fruit fly, lesser pumpkin fly. Taille moyenne (envergure des ailes 4.4-6.0 mm). L'espèce peut facilement être confondue avec *Dacus frontalis*. L'un des principaux ravageurs des cucurbitacées sauvages et cultivées mais se retrouve parfois aussi sur les Solanaceae cultivées. Largement répandue en Afrique subsaharienne y compris les zones plus sèches de la ceinture sahélienne. Les deux sexes sont peu attirés par des appâts protéiques.

Informations supplémentaires: <http://projects.bebif.be/fruitfly/taxoninfo.html?id=272> Restriction: ces fiches signalétiques se limitent aux caractères observés chez les principales espèces nuisibles mais ne tiennent pas compte des similitudes/différences entre TOUTES les espèces de mouches des fruits présentes en Afrique occidentale. Copyright: texte G. Goergen, IITA; images G. Goergen, IITA & \*NHM, London. Remerciements: M. De Meyer, MRAC est remercié pour son appui à la conceptualisation des fiches signalétiques.