



## *Zeugodacus cucurbitae* (Coquillett)



Petites marques semi-circulaires antérieures à la suture transversale

Stries jaunes médianes et latérales présentes

Bande costale développée en une large tache apicale

Aile avec bande transversale préapicale



Tergites abdominaux 3-5 avec marquage noir en forme de T

Mouche du melon, au préalable placé dans le genre *Bactrocera*. Taille moyenne (envergure des ailes 4.2-7.1 mm). Ravageur très polyphage mais préfère les plantes cucurbitacées. L'espèce est originaire d'Asie orientale et a envahi de grandes parties de l'Afrique occidentale et orientale. Les deux sexes peuvent être piégés par des produits à base d'appâts protéiques. Les mâles sont attirés par le cueilure.

**Informations supplémentaires:** <http://projects.bebif.be/fruitfly/taxoninfo.html?id=175> **Restriction:** ces fiches signalétiques se limitent aux caractères observés chez les principales espèces nuisibles mais ne tiennent pas compte des similitudes/différences entre TOUTES les espèces de mouches des fruits présentes en Afrique occidentale. **Copyright:** texte & images G. Goergen, IITA. **Remerciements:** M. De Meyer, MRAC est remercié pour son appui à la conceptualisation des fiches signalétiques.